

Linear Algebra I

Supplementaries - 8

ζ

November 14, 2022

注: 本次讲义拟提前给出一些知识点, 便于后续学习时的术语使用, 本讲义仅有最后部分的题目是需要做的, 其余有兴趣者可自行查阅学习.

1 线性空间及线性关系

1.1 线性空间及举例

线性空间亦称为向量空间, 它是线性代数的中心内容和基本概念之一. 我们常见的 n 维欧氏空间, $m \times n$ 矩阵, $C[0, 1]$, 即 $[0, 1]$ 区间的实值连续函数等都可以看作线性空间.

一个线性空间本质上是两个集合及两个映射. V 是一个非空集合, Ω 是一个域. 我们定义两个映射 $+: V \times V \rightarrow V$, $\cdot: \Omega \times V \rightarrow V$, 分别称为加法与数乘, 对 $\alpha, \beta, \gamma \in V$, $k, l \in \Omega$ 满足以下八个条件:

- (i) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$, 对任意 $\alpha, \beta \in V$.
- (ii) $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$, 对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V$.
- (iii) 存在一个元素 $\mathbf{0}$, 使得对一切 $\alpha \in V$ 都有 $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$.
- (iv) 对任一 $\alpha \in V$, 都存在 $\beta \in V$ 使得 $\alpha + \beta = \mathbf{0}$, 一般将 β 记为 $-\alpha$.
- (v) 对 Ω 中的单位元 1 , 有 $1\alpha = \alpha$, 对任意 $\alpha \in V$ 成立.
- (vi) 对任意 $k, l \in \Omega$, $\alpha \in V$, 有 $(kl)\alpha = k(l\alpha)$.
- (vii) 对任意 $k, l \in \Omega$, $\alpha \in V$, 有 $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$.
- (viii) 对任意 $k \in \Omega$, $\alpha, \beta \in V$, 有 $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$.

这是我们在代数学习中遇到的第一个代数系统, 一部分结论不可认为显然而得. 以下我们举例几则, 从以上的系统中推得一些我们理所当然之结论.

Proposition 1.1. 在线性空间中, 以下结论成立

- (i) 零元 $\mathbf{0}$ 是唯一的,
- (ii) 任意一个向量 α 的逆元是唯一的,
- (iii) 对任意向量 α , 有 $0\alpha = \mathbf{0}$,

(iv) 对任意向量 α , 有 $(-1)\alpha = -\alpha$.

证明. 仅作思路概述

(i) 假设有另一零元 $\mathbf{0}'$, 则 $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}'$.

(ii) 假设对某一 α 有两逆元 β, β' , 则 $\beta = \beta + (\alpha + \beta') = (\beta + \alpha) + \beta' = \beta'$

(iii) $0\alpha = (0 + 0)\alpha = 0\alpha + 0\alpha$, 则有 $0\alpha = \mathbf{0}$.

(iv) $\mathbf{0} = (1 + (-1))\alpha = \alpha + (-1)\alpha$, 由此可得 $(-1)\alpha = -\alpha$.

□

下面我们给出几个线性空间的例子, 读者可以自行验证.

Example 1.1 (n 维欧氏空间). n 维欧式空间 \mathbb{R}^n , 在域 \mathbb{R} 上为线性空间. n 维欧式空间 \mathbb{R}^n 可以看作 n 长度的数对.

Example 1.2 (同型矩阵). 域 Ω 上的 $m \times n$ 型矩阵为一线性空间, 加法定义为矩阵加法, 数乘为 Ω 上, 在所有分量上作乘法.

Example 1.3. $[0, 1]$ 区间上的所有连续函数, 记为 $C[0, 1]$. 其关于函数的逐点加法, 和实数 \mathbb{R} 的乘法成为 \mathbb{R} 上的线性空间.

1.2 线性相关性与基底

我们通过欧氏空间的例子引出线性相关性和基底的概念.

在欧式空间 (或看作矩阵) \mathbb{R}^n 中, 我们有如下的形式的向量:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

我们发现我们常称之为 n 维空间之基底, 其原因为我们不可以通过 $k_1\mathbf{e}_1 + k_2\mathbf{e}_2 + \dots + k_n\mathbf{e}_n$ 的形式将其组合成为 $\mathbf{0}$, 否则只能有 $k_1 = k_2 = \dots = k_n$. 称此 n 向量线性无关.

而以另外三个向量为例, 如 $\mathbf{x}_1 = (1, 2, 3)^T$, $\mathbf{x}_2 = (1, 1, 1)^T$, $\mathbf{x}_3 = (0, 2, 4)^T$. 我们则可以写出 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{x}_3$. 此时称这三个向量线性相关.

Definition 1.1 (线性相关性). 若对于线性空间 V 中的某 m 个向量 \mathbf{x}_i , 存在一组非零的系数 k_i , 使得 $k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2 + \dots + k_m\mathbf{x}_m = \mathbf{0}$, 则称这 m 个向量线性相关, 否则则称其线性无关.

形如以上线性组合的所有向量都称为被 \mathbf{x}_i 张成, 所有能被 \mathbf{x}_i 张成的向量与 $\mathbf{0}$ 构成了一个线性空间, 称为被向量组 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ 张成的线性空间, 记为 $\text{span}[\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m]$.

若一个线性空间能够被其中有限个向量张成, 则称这个线性空间是有限维的, 否则称为无穷维的. 对于有限维线性空间, 生成它的向量个数的最小值 (证明是良定义的) 称为线性空间的维数, 记为 $n = \dim V$. 这 n 个向量此时称为线性空间 V 的基底.

线性空间的基底是线性无关的向量组, 任意 $\dim V$ 个线性无关向量的向量组张成的线性空间恰好为 V .

1.3 线性映射

Definition 1.2. Ω 上线性空间 V 到 W 的线性映射定义为 V 到 W 的映射 f , 满足

$$(i) f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta),$$

$$(ii) f(k\alpha) = kf(\alpha).$$

其中 $\alpha, \beta \in V, k \in \Omega$.

我们跳过子空间的定义, 不了解的读者可自行查询.

Proposition 1.2. V 中线性无关向量组 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$, 线性映射 $f: V \rightarrow W$ 在其上的取值 $f(\mathbf{x}_i)_{1 \leq i \leq m}$ 唯一确定了一个子空间上的线性映射

$$f_{ind}: \text{span}[\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m] \rightarrow W.$$

由此我们知道, 任意一个线性映射可以由原空间一组基底上的值唯一确定.

Definition 1.3. 给定 Ω 上线性空间 V 到 W 的线性映射 $f: V \rightarrow W$, 定义

$$\ker f = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \in W\}.$$

$$\text{Im} f = \{f(\mathbf{v}) \in W \mid \mathbf{v} \in V\}.$$

验证两者分别为 V, W 的子空间.

Proposition 1.3. Ω 上有限维线性空间 V 到 W 有线性映射 f , 分别指定基底 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ 和 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$. 则线性映射 f 可给出矩阵表示

$$f(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m) \mathbf{A}_{m \times n}.$$

意味着 $f(\mathbf{v}_i) = a_{1i}\mathbf{w}_1 + a_{2i}\mathbf{w}_2 + \dots + a_{mi}\mathbf{w}_m, 1 \leq i \leq n$.

关于有限维空间, 可以直接分别在 n 维欧氏空间和 m 维欧氏空间给出非平凡的基底, 然后自行出题加以练习.

我们发现虽然我们可以根据基底给出一个线性映射的刻画, 但似乎线性映射是两个线性空间之间内嵌的某个关系, 若我们变动一个基底, 那么这个矩阵刻画会有如何的变化? 现假设有另一组 V 的基底 $\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n$, 满足

$$(\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \mathbf{P}_{n \times n}.$$

其中可逆矩阵 P 称为过渡矩阵, 则有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}'_1, \mathbf{v}'_2, \dots, \mathbf{v}'_n) &= f((\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \mathbf{P}_{n \times n}) = f((\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)) \mathbf{P}_{n \times n} \\ &= (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m) \mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{P}_{n \times n}. \end{aligned}$$

思考: 为什么矩阵可以提到 f 外面来? 若线性变换为 V 到 V 的, 并把两组基底取成相同一组, 那么矩阵表示在变动基底时会有什么变化?

为了便于理解线性映射, 我们再给出几个例子, 其中的线性空间未必是有限维的.

Example 1.4. 记 $C^1[0, 1]$ 为区间 $[0, 1]$ 上的连续可微函数 (导函数连续的函数) 构成的线性空间, 则微分函子 d 是 $C^1[0, 1]$ 到 $C[0, 1]$ 的线性映射.

$$d: g \in C^1[0, 1] \rightarrow g' \in C[0, 1].$$

且 $\ker d = \{g \in C^1[0, 1] \mid g \equiv \text{const}\}$.

2 等价关系构造映射

等价关系构造映射的思想来源于很多领域, 其本质是将等价关系的等价类”浓缩”为一点, 由此便可以生成新的结构. 为了诱导新的映射, 我们要求所考虑的映射在等价类上取相同的值. 粗浅地讲, 我们进行了如下过程.

Proposition 2.1. 设 f 为集合 S 到集合 T 的映射, \sim 为 S 上的一个等价关系. 若 $x \sim y \in S$ 时有 $f(x) = f(y)$, 则存在一个诱导的映射 $\tilde{f}: \tilde{S} = S/\sim \rightarrow T$. 其中 S/\sim 指的是 S 商去等价关系, 即将等价类看作一个元素. 我们还有商映射 $\pi: S \rightarrow \tilde{S}$, $\pi: x \rightarrow [x]$, 将每个元素映射至其等价类.

在某些特殊结构上, 我们可以得到很多丰富的结果, 我们列举如下几则, 感兴趣可自行查阅.

- (1) $f: V \rightarrow W$ 为线性空间之间的线性映射, 等价关系取 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \ker f$. 由 $\ker f$ 子空间诱导.
- (2) $\phi: G \rightarrow H$ 为群之间的同态, 等价关系取 $x \sim y$ 当且仅当 $x^{-1}y \in \ker \phi$. 由 $\ker \phi$ 正规子群诱导.
- (3) $\phi: R \rightarrow S$ 为环之间的同态, 等价关系取 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \ker \phi$. 由 $\ker \phi$ 环的理想诱导.
- (4) $f: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的连续映射, 等价关系取 $x \sim y$ 可自行构造, 则可诱导商空间与商拓扑.
- (5) 任意两个 R 模 M, N , 其张量积 $M \otimes N$ 是在其笛卡尔积生成的模上取等价关系 $(rm, n) \sim (m, rn)$, 其中 $m \in M, n \in N, r \in R$.

3 Kronecker 积 (Tensor Product)

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 和 $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 分别是 $m \times n$ 阶和 $k \times l$ 阶矩阵, 定义他们的 Kronecker 积为一个 $mk \times nl$ 阶矩阵:

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11}\mathbf{B} & a_{12}\mathbf{B} & \dots & a_{1n}\mathbf{B} \\ a_{21}\mathbf{B} & a_{22}\mathbf{B} & \dots & a_{2n}\mathbf{B} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}\mathbf{B} & a_{m1}\mathbf{B} & \dots & a_{mn}\mathbf{B} \end{pmatrix}$$

Problem 3.1. 证明矩阵的 Kronecker 积满足下列性质 (假设以下的矩阵加法和乘法都有意义):

(1) $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C} = \mathbf{A} \otimes \mathbf{C} + \mathbf{B} \otimes \mathbf{C};$

(2) $\mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \otimes \mathbf{B} + \mathbf{A} \otimes \mathbf{C};$

(3) $(k\mathbf{A}) \otimes \mathbf{B} = k(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \mathbf{A} \otimes (k\mathbf{B});$

(4) $\mathbf{I}_m \otimes \mathbf{I}_n = \mathbf{I}_{mn};$

(5) $(\mathbf{AB}) \otimes (\mathbf{CD}) = (\mathbf{A} \otimes \mathbf{C})(\mathbf{B} \otimes \mathbf{D});$

(6) $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C} = \mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} \otimes \mathbf{C});$

(7) 若 \mathbf{A}, \mathbf{B} 都是可逆矩阵, 则 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ 也是可逆矩阵, 并且

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1};$$

(8) 若 \mathbf{A} 是 m 阶矩阵, \mathbf{B} 是 n 阶矩阵, 则 $|\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}| = |\mathbf{A}|^n |\mathbf{B}|^m.$

4 矩阵可逆性刻画

Problem 4.1. n 阶方阵 \mathbf{A} 的行列式为零的充分必要条件是, 其某行 (列) 可以表示为其它行 (列) 的线性组合. (我们在行列式运算中曾了解充分性, 其实此命题是充分必要的)

Problem 4.2. 我们称一个矩阵是行对角占优的, 指对于方阵 \mathbf{A} 的元素 a_{ij} , 有

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, n)$$

如果上述定义的不等式都严格成立, 则称为行严格对角占优矩阵.

证明: 如果 \mathbf{A} 具有严格对角占优, 则 \mathbf{A} 为非奇异矩阵; 如果此外 \mathbf{A} 的主对角线元素均为正数, 则 \mathbf{A} 的行列式大于零.